

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом**19**

Решите систему уравнений
$$\begin{cases} 2x - y = -8 \\ \frac{x-1}{2} + \frac{y}{3} = 1. \end{cases}$$

Ответ: $(-1; 6)$; другие возможные формы ответа: $\begin{cases} x = -1 \\ y = 6 \end{cases}; x = -1, y = 6.$

Решение. Подставим $y = 2x + 8$ во второе уравнение системы, получим уравнение относительно x : $\frac{x-1}{2} + \frac{2x+8}{3} = 1$. Отсюда: $x = -1$. Подставим $x = -1$ в уравнение $y = 2x + 8$, получим: $y = 6$. Пара $(-1; 6)$ – решение системы.

Замечание. Можно сразу привести второе уравнение к целому виду, а дальше для решения системы использовать или способ подстановки, или способ сложения.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
2	Все преобразования и вычисления выполнены правильно, получен верный ответ.
1	Ход решения правильный, но допущена одна ошибка вычислительного характера (или описка), с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

20

Какое из чисел больше: $\sqrt{6} + \sqrt{10}$ или $3 + \sqrt{7}$?

Ответ: $3 + \sqrt{7}$.

Решение. Найдём квадраты чисел $\sqrt{6} + \sqrt{10}$ и $3 + \sqrt{7}$:

$$(\sqrt{6} + \sqrt{10})^2 = 16 + 2\sqrt{60} = 16 + \sqrt{240}; \quad (3 + \sqrt{7})^2 = 16 + 6\sqrt{7} = 16 + \sqrt{252}.$$

Так как $\sqrt{252} > \sqrt{240}$, то $(3 + \sqrt{7})^2 > (\sqrt{6} + \sqrt{10})^2$.

Учитывая, что $\sqrt{6} + \sqrt{10}$ и $3 + \sqrt{7}$ – положительные числа, получаем, что $3 + \sqrt{7} > \sqrt{6} + \sqrt{10}$.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
3	Найден правильный ход решения, все его шаги выполнены верно, получен верный ответ.
2	Ход решения правильный, но допущена одна вычислительная ошибка при преобразовании выражений.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

21

Найдите сумму всех положительных членов арифметической прогрессии $12,8; 12,4; \dots$

Ответ: 211,2.

Решение. 1) Найдём разность прогрессии: $d = 12,4 - 12,8 = -0,4$.

2) Найдём число положительных членов прогрессии.

Составим формулу n -го члена: $a_n = 12,8 - 0,4(n-1) = 13,2 - 0,4n$.

Решим неравенство $13,2 - 0,4n > 0$; получим: $n < 33$. Значит, $n = 32$.

$$3) S_{32} = \frac{(2 \cdot 12,8 - 0,4 \cdot 31) \cdot 32}{2} = 211,2.$$

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
3	Ход решения правильный, все его шаги выполнены верно, получен верный ответ.
2	Ход решения правильный, решение доведено до конца, но допущена одна описка или принципиальная ошибка вычислительного характера, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

22 При каких значениях p вершины парабол $y = x^2 - 2px - 1$ и $y = -x^2 + 4px + p$ расположены по разные стороны от оси x ?

Ответ: при $p < -\frac{1}{4}$ и $p > 0$.

Решение. Найдём дискриминант трёхчлена $x^2 - 2px - 1$: $D_1 = p^2 + 1$. При любом значении p дискриминант положителен, значит, парабола $y = x^2 - 2px - 1$ всегда пересекает ось x . Так как ветви параболы направлены вверх, то её вершина всегда находится ниже оси x .

Выясним, при каких значениях p вершина параболы $y = -x^2 + 4px + p$ располагается выше оси x . Ветви этой параболы направлены вниз, поэтому нужно выяснить, при каких значениях p эта парабола пересекает ось x , т.е. при каких p её дискриминант положителен:

$$D_1 = 4p^2 + p; \quad 4p^2 + p > 0; \quad p < -\frac{1}{4}, p > 0.$$

Замечание. Тот факт, что вершина первой параболы всегда находится ниже оси x , можно обосновать так: точка пересечения параболы с осью y расположена ниже оси x , а её ветви направлены вверх.

Другое возможное решение. Найдём ординату вершины каждой параболы:

$$1) y = x^2 - 2px - 1; \quad y_0 = -p^2 - 1;$$

$$2) y = -x^2 + 4px + p; \quad y_0 = 4p^2 + p;$$

При любом значении p выполняется неравенство $-p^2 - 1 < 0$, значит, вершина параболы $y = x^2 - 2px - 1$ всегда находится ниже оси x .

Найдём значения p , при которых ордината вершины второй параболы положительна: $4p^2 + p > 0$; $p < -\frac{1}{4}, p > 0$.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
4	Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ.
3	Ход решения верный, но допущена вычислительная ошибка или описка, с её учётом решение доведено до конца.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям.

23 При смешивании первого раствора кислоты, концентрация которого 20%, и второго раствора этой же кислоты, концентрация которого 50%, получили раствор, содержащий 30% кислоты. В каком отношении были взяты первый и второй растворы?

Ответ: в отношении 2 : 1.

Решение. Пусть масса первого раствора равна x , а масса второго равна y . Тогда количество кислоты в первом растворе составляет $0,2x$, а во втором – $0,5y$. Масса раствора, получившегося после смешивания, равна $x + y$, а количество кислоты в нём составляет $0,3(x + y)$. Имеем уравнение, $0,2x + 0,5y = 0,3(x + y)$. После преобразования получим: $2x + 5y = 3x + 3y$,

$$x = 2y. \text{ Откуда } \frac{x}{y} = \frac{2}{1}.$$

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
4	Правильно составлено уравнение, найдено нужное отношение, дан верный ответ.
3	При правильной идее решения допущена вычислительная ошибка, в результате получено другое отношение; или допущена ошибка на последнем шаге, т.е. из равенства $x = 2y$ неверно найдено отношение $x : y$.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

Комментарий. Ответ может быть дан и в другом виде, например: $x : y = 2$.

Если в ответе указано отношение y к x , например, так: $y : x = 1 : 2$, или так: $y : x = \frac{1}{2}$, то решение следует считать верным.

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом**19**

Решите систему уравнений
$$\begin{cases} 3x + y = 5 \\ \frac{x+2}{5} + \frac{y}{2} = -1. \end{cases}$$

Ответ: (3; -4); другие возможные формы ответа: $\begin{cases} x=3 \\ y=-4; \end{cases} x=3, y=-4.$

Решение. Подставим $y=5-3x$ во второе уравнение системы, получим уравнение относительно x : $\frac{x+2}{5} + \frac{5-3x}{2} = -1$. Отсюда: $x=3$. Подставим $x=3$ в уравнение $y=5-3x$, получим: $y=-4$. Пара (3; -4) – решение системы.

Замечание. Можно сразу привести второе уравнение к целому виду, а дальше для решения системы использовать или способ подстановки, или способ сложения.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
2	Все преобразования и вычисления выполнены правильно, получен верный ответ.
1	Ход решения правильный, но допущена одна ошибка вычислительного характера (или описка), с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

20

Какое из чисел больше: $3+\sqrt{5}$ или $\sqrt{8}+\sqrt{6}$?

Ответ: $\sqrt{8}+\sqrt{6}$.

Решение. Найдём квадраты чисел $3+\sqrt{5}$ и $\sqrt{8}+\sqrt{6}$:
 $(3+\sqrt{5})^2 = 14+6\sqrt{5} = 14+\sqrt{180}$; $(\sqrt{8}+\sqrt{6})^2 = 14+2\sqrt{48} = 14+\sqrt{192}$. Так как $\sqrt{192} > \sqrt{180}$, то $(\sqrt{8}+\sqrt{6})^2 > (3+\sqrt{5})^2$. Учитывая, что $\sqrt{8}+\sqrt{6}$ и $3+\sqrt{5}$ – положительные числа, получаем, что $\sqrt{8}+\sqrt{6} > 3+\sqrt{5}$.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
3	Найден правильный ход решения, все его шаги выполнены верно, получен верный ответ.
2	Ход решения правильный, но допущена одна вычислительная ошибка при преобразовании выражений.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

21

Найдите сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии $-6,8; -6,6; \dots$

Ответ: -119.

Решение. 1) Найдём разность прогрессии: $d = -6,6 + 6,8 = 0,2$.

2) Найдём число отрицательных членов прогрессии.

Составим формулу n -го члена: $a_n = -6,8 + 0,2(n-1) = 0,2n - 7$.

Решим неравенство $0,2n - 7 < 0$; получим: $n < 35$. Значит, $n = 34$.

3) $S_{34} = \frac{(2 \cdot (-6,8) + 0,2 \cdot 33) \cdot 34}{2} = -119$.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
3	Ход решения правильный, все его шаги выполнены верно, получен верный ответ.
2	Ход решения правильный, решение доведено до конца, но допущена одна описка или непринципиальная ошибка вычислительного характера, с её учетом дальнейшие шаги выполнены верно.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

Комментарий. Ошибки в применении формул, в том числе в подстановке числовых значений в формулы, считаются существенными, решение оценивается 0 баллов.

- 22** При каких значениях m вершины парабол $y = -x^2 - 6mx + m$ и $y = x^2 - 4mx - 2$ расположены по одну сторону от оси x ?

Ответ: при $-\frac{1}{9} < m < 0$.

Решение. Найдём дискриминант трёхчлена $x^2 - 4mx - 2$: $D_1 = 4m^2 + 2$. При любом значении m дискриминант положителен, значит, парабола $y = x^2 - 4mx - 2$ всегда пересекает ось x . Так как ветви параболы направлены вверх, то её вершина всегда находится ниже оси x .

Выясним, при каких значениях m вершина параболы $y = -x^2 - 6mx + m$ располагается ниже оси x . Ветви этой параболы направлены вниз, поэтому нужно выяснить, при каких значениях m эта парабола не пересекает ось x , т.е. при каких m её дискриминант отрицателен:

$$D_1 = 9m^2 + m; \quad 9m^2 + m < 0; \quad -\frac{1}{9} < m < 0.$$

Замечание. Тот факт, что вершина второй параболы всегда находится ниже оси x , можно обосновать так: точка пересечения параболы с осью y расположена ниже оси x , а её ветви направлены вверх.

Другое возможное решение. Найдём ординату вершины каждой параболы:

$$1) y = -x^2 - 6mx + m; \quad y_0 = 9m^2 + m;$$

$$2) y = x^2 - 4mx - 2; \quad y_0 = -4m^2 - 2.$$

При любом значении m выполняется неравенство $-4m^2 - 2 < 0$, значит, вершина параболы $y = x^2 - 4mx - 2$ всегда находится ниже оси x .

Найдём значения m , при которых ордината вершины параболы

$$y = -x^2 - 6mx + m \text{ также отрицательна: } 9m^2 + m < 0; \quad -\frac{1}{9} < m < 0.$$

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
4	Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ.
3	Ход решения верный, но допущена вычислительная ошибка или описка, с её учётом решение доведено до конца.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям.

- 23** Имеется два сплава с разным содержанием меди: в первом содержится 70%, а во втором – 40% меди. В каком отношении надо взять первый и второй сплавы, чтобы получить из них новый сплав, содержащий 50% меди?

Ответ: 1 : 2.

Решение. Пусть x – масса первого сплава, y – масса второго сплава. Тогда количество меди в первом сплаве составляет $0,7x$, а во втором – $0,4y$. Масса нового сплава равна $x + y$, а количество меди в нём составляет $0,5(x + y)$. Имеем уравнение $0,7x + 0,4y = 0,5(x + y)$. После преобразований получим:

$$7x + 4y = 5x + 5y; \quad 2x = y. \text{ Отсюда } \frac{x}{y} = \frac{1}{2}.$$

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
4	Правильно составлено уравнение, найдено нужное отношение, дан верный ответ.
3	При правильной идее решения допущена вычислительная ошибка, в результате получено другое отношение; или допущена ошибка на последнем шаге, т.е. из равенства $2x = y$ неверно найдено отношение $x : y$.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

Комментарий. Ответ может быть дан и в другом виде, например: $x : y = \frac{1}{2}$.

Если в ответе указано отношение y к x , например, так: $y : x = 2 : 1$, или так: $y : x = 2$, то решение следует считать верным.

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом**19**

Решите систему уравнений
$$\begin{cases} 3x - y = 10 \\ \frac{x}{3} + \frac{y+1}{5} = 1. \end{cases}$$

Ответ: (3; -1); другие возможные формы ответа: $\begin{cases} x = 3 \\ y = -1; \end{cases} x = 3, y = -1.$

Решение. Подставим $y = 3x - 10$ во второе уравнение системы, получим уравнение относительно x : $\frac{x}{3} + \frac{3x - 10}{5} = 1$. Отсюда $x = 3$. Подставим $x = 3$ в уравнение $y = 3x - 10$, получим: $y = -1$. Пара (3; -1) – решение системы.

Замечание. Можно сразу привести второе уравнение к целому виду, а дальше для решения системы использовать или способ подстановки, или способ сложения.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
2	Все преобразования и вычисления выполнены правильно, получен верный ответ.
1	Ход решения правильный, но допущена одна ошибка вычислительного характера (или описка), с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

20

Какое из чисел больше: $\sqrt{5} + \sqrt{6}$ или $2 + \sqrt{7}$?

Ответ: $\sqrt{5} + \sqrt{6}$.

Решение. Найдём квадраты чисел $\sqrt{5} + \sqrt{6}$ и $2 + \sqrt{7}$:
 $(\sqrt{5} + \sqrt{6})^2 = 11 + 2\sqrt{30} = 11 + \sqrt{120}$; $(2 + \sqrt{7})^2 = 11 + 4\sqrt{7} = 11 + \sqrt{112}$. Так как $\sqrt{120} > \sqrt{112}$, то $(\sqrt{5} + \sqrt{6})^2 > (2 + \sqrt{7})^2$. Учитывая, что $\sqrt{5} + \sqrt{6}$ и $2 + \sqrt{7}$ – положительные числа, получаем, что $\sqrt{5} + \sqrt{6} > 2 + \sqrt{7}$.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
3	Найден правильный ход решения, все его шаги выполнены верно, получен верный ответ.
2	Ход решения правильный, но допущена одна вычислительная ошибка при преобразовании выражений.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

21

Найдите сумму всех положительных членов арифметической прогрессии 11,2; 10,8; ...

Ответ: 162,4.

Решение. 1) Найдём разность прогрессии: $d = 10,8 - 11,2 = -0,4$.

2) Найдём число положительных членов прогрессии.

Составим формулу n -го члена: $a_n = 11,2 - 0,4(n - 1) = 11,6 - 0,4n$.

Решим неравенство $11,6 - 0,4n > 0$; получим: $n < 29$. Значит, $n = 28$.

$$3) S_{28} = \frac{(2 \cdot 11,2 - 0,4 \cdot 27) \cdot 28}{2} = 162,4.$$

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
3	Ход решения правильный, все его шаги выполнены верно, получен верный ответ.
2	Ход решения правильный, решение доведено до конца, но допущена одна описка или не принципиальная ошибка вычислительного характера, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

Комментарий. Ошибки в применении формул, в том числе в подстановке числовых значений в формулы, считаются существенными, решение оценивается 0 баллов.

22 При каких значениях p вершины парабол $y = -x^2 + 2px + 3$ и $y = x^2 - 6px + p$ расположены по разные стороны от оси x ?

Ответ: при $p < 0$ и $p > \frac{1}{9}$.

Решение. Найдём дискриминант трёхчлена $-x^2 + 2px + 3$: $D_1 = p^2 + 3$. При любом значении p дискриминант положителен, значит, парабола $y = -x^2 + 2px + 3$ всегда пересекает ось x . Так как ветви параболы направлены вниз, то её вершина всегда находится выше оси x .

Выясним, при каких значениях p вершина параболы $y = x^2 - 6px + p$ располагается ниже оси x . Ветви этой параболы направлены вверх, поэтому нужно выяснить, при каких значениях p эта парабола пересекает ось x , т.е. при каких p её дискриминант положителен:

$$D_1 = 9p^2 - p; \quad 9p^2 - p > 0; \quad p < 0, p > \frac{1}{9}.$$

Замечание. Тот факт, что вершина первой параболы всегда находится выше оси x , можно обосновать так: точка пересечения параболы с осью y расположена ниже оси x , а её ветви направлены вниз.

Другое возможное решение. Найдём ординату вершины каждой параболы:

$$1) y = -x^2 + 2px + 3: \quad y_0 = p^2 + 3;$$

$$2) y = x^2 - 6px + p; \quad y_0 = -9p^2 + p.$$

При любом значении p выполняется неравенство $p^2 + 3 > 0$, значит, вершина первой параболы всегда находится выше оси x .

Найдём значения p , при которых ордината вершины второй параболы отрицательна: $-9p^2 + p < 0$; $9p^2 - p > 0$; $p < 0, p > \frac{1}{9}$.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
4	Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ.
3	Ход решения верный, но допущена вычислительная ошибка или описка, с её учётом решение доведено до конца.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям.

23 При смешивании первого раствора соли, концентрация которого 40%, и второго раствора этой же соли, концентрация которого 48%, получился раствор с концентрацией 42%. В каком отношении были взяты первый и второй растворы?

Ответ: 3 : 1.

Решение. Пусть x – масса первого раствора, y – масса второго раствора. Тогда количество соли в первом растворе составляет $0,4x$, а во втором – $0,48y$. Масса раствора, получившегося после смешивания, равна $x + y$, а количество соли в нём составляет $0,42(x + y)$.

Имеем уравнение $0,4x + 0,48y = 0,42(x + y)$. После преобразований получим

$$40x + 48y = 42x + 42y; \quad x = 3y. \quad \text{Отсюда } \frac{x}{y} = \frac{3}{1}.$$

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
4	Правильно составлено уравнение, найдено нужное отношение, дан верный ответ.
3	При правильной идее решения допущена вычислительная ошибка, в результате получено другое отношение; или допущена ошибка на последнем шаге, т.е. из равенства $x = 3y$ неверно найдено отношение $x : y$.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

Комментарий. Ответ может быть дан и в другом виде, например, $x : y = 3$.

Если в ответе указано отношение y к x , например, так: $y : x = 1 : 3$, или так:

$y : x = \frac{1}{3}$, то решение следует считать верным.

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом

19

Решите систему уравнений
$$\begin{cases} x - 2y = -8 \\ \frac{x}{4} + \frac{y-2}{3} = -1. \end{cases}$$

Ответ: $(-4; 2)$; другие возможные формы ответа: $\begin{cases} x = -4 \\ y = 2; \end{cases} x = -4, y = 2.$

Решение. Подставим $x = 2y - 8$ во второе уравнение системы, получим уравнение относительно y : $\frac{2y-8}{4} + \frac{y-2}{3} = -1$. Отсюда $y = 2$. Подставим $y = 2$ в уравнение $x = 2y - 8$, получим: $x = -4$. Пара $(-4; 2)$ – решение системы.

Замечание. Можно сразу привести второе уравнение к целому виду, а дальше для решения системы использовать или способ подстановки, или способ сложения.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
2	Все преобразования и вычисления выполнены правильно, получен верный ответ.
1	Ход решения правильный, но допущена одна ошибка вычислительного характера (или описка), с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

20

Какое из чисел больше: $2 + \sqrt{11}$ или $\sqrt{5} + \sqrt{10}$?

Ответ: $\sqrt{5} + \sqrt{10}$.

Решение. Найдём квадраты чисел $2 + \sqrt{11}$ и $\sqrt{5} + \sqrt{10}$:
 $(2 + \sqrt{11})^2 = 15 + 4\sqrt{11} = 15 + \sqrt{176}$; $(\sqrt{5} + \sqrt{10})^2 = 15 + 2\sqrt{50} = 15 + \sqrt{200}$. Так как $\sqrt{200} > \sqrt{176}$, то $(\sqrt{5} + \sqrt{10})^2 > (2 + \sqrt{11})^2$. Учитывая, что $\sqrt{5} + \sqrt{10}$ и $2 + \sqrt{11}$ – положительные числа, получаем, что $\sqrt{5} + \sqrt{10} > 2 + \sqrt{11}$.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
3	Найден правильный ход решения, все его шаги выполнены верно и получен верный ответ.
2	Ход решения правильный, но допущена одна вычислительная ошибка при преобразовании выражений.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

21

Найдите сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии $-7,2; -6,9; \dots$

Ответ: -90 .

Решение. 1) Найдём разность прогрессии: $d = -6,9 + 7,2 = 0,3$.

2) Найдём число отрицательных членов прогрессии.

Составим формулу n -го члена: $a_n = -7,2 + 0,3(n-1) = 0,3n - 7,5$.

Решим неравенство $0,3n - 7,5 < 0$; получим: $n < 25$. Значит, $n = 24$.

3) $S_{24} = \frac{(2 \cdot (-7,2) + 0,3 \cdot 23) \cdot 24}{2} = -90$.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
3	Ход решения правильный, все его шаги выполнены верно, получен верный ответ.
2	Ход решения правильный, решение доведено до конца, но допущена одна описка или не принципиальная ошибка вычислительного характера, с её учётом дальнейшие шаги выполнены верно.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

Комментарий. Ошибки в применении формул, в том числе в подстановке числовых значений в формулы, считаются существенными, решение оценивается 0 баллов.

22 При каких значениях m вершины парабол $y = x^2 - 4mx + m$ и $y = -x^2 + 8mx + 4$ расположены по одну сторону от оси x ?

Ответ: при $0 < m < \frac{1}{4}$.

Решение. Найдём дискриминант трёхчлена $-x^2 + 8mx + 4$: $D_1 = 16m^2 + 4$. При любом значении m дискриминант положителен, значит, парабола $y = -x^2 + 8mx + 4$ всегда пересекает ось x . Так как ветви параболы направлены вниз, то её вершина всегда находится выше оси x .

Выясним, при каких значениях m вершина параболы $y = x^2 - 4mx + m$ располагается выше оси x . Ветви этой параболы направлены вверх, поэтому нужно выяснить, при каких значениях m эта парабола не пересекает ось x , т.е. при каких m её дискриминант отрицателен:

$$D_1 = 4m^2 - m; \quad 4m^2 - m < 0; \quad 0 < m < \frac{1}{4}.$$

Замечание. Тот факт, что вершина второй параболы всегда находится выше оси x , можно обосновать так: точка пересечения параболы с осью y расположена ниже оси x , а её ветви направлены вниз.

Другое возможное решение. Найдём ординату вершины каждой параболы:

1) $y = x^2 - 4mx + m; \quad y_0 = -4m^2 + m;$

2) $y = -x^2 + 8mx + 4; \quad y_0 = 16m^2 + 4.$

При любом значении m выполняется неравенство $16m^2 + 4 > 0$, значит, вершина параболы $y = -x^2 + 8mx + 4$ всегда находится выше оси x .

Найдём значения m , при которых ордината вершины первой параболы также положительна: $-4m^2 + m > 0; \quad 4m^2 - m < 0; \quad 0 < m < \frac{1}{4}$.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
4	Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ.
3	Ход решения верный, но допущена вычислительная ошибка или описка, с её учётом решение доведено до конца.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям.

23 Имеется два сплава с разным содержанием золота. В первом сплаве содержится 35% золота, а во втором – 60%. В каком отношении надо взять первый и второй сплавы, чтобы получить из них новый сплав, содержащий 40% золота?

Ответ: 4 : 1.

Решение. Пусть x – масса первого сплава, y – масса второго сплава. Тогда количество золота в первом сплаве составляет $0,35x$, а во втором – $0,6y$. Масса нового сплава равна $x + y$, а количество золота в нём составляет $0,4(x + y)$. Имеем уравнение $0,35x + 0,6y = 0,4(x + y)$. После преобразований

получим: $35x + 60y = 40x + 40y, \quad x = 4y$. Отсюда $\frac{x}{y} = \frac{4}{1}$.

Баллы	Критерии оценки выполнения задания
4	Правильно составлено уравнение, найдено нужное отношение, дан верный ответ.
3	При правильной идее решения допущена вычислительная ошибка, в результате получено другое отношение; или допущена ошибка на последнем шаге, т.е. из равенства $x = 4y$ неверно найдено отношение $x : y$.
0	Другие случаи, не соответствующие указанным критериям.

Комментарий. Ответ может быть дан и в другом виде, например, $x : y = 4$.

Если в ответе указано отношение y к x , например, так: $y : x = 1 : 4$, или

так: $y : x = \frac{1}{4}$, то решение следует считать верным.